

RESUMEN

Las lesiones en la mucosa bucal no todas tienen el mismo origen etiológico, de ahí la necesidad de hacer un diagnóstico diferencial, puesto que unas son de origen traumático, de origen químico, de origen físico, bacterianas, viral, micótico, mucocutáneo, por enfermedades generales y por inmunodeficiencias.

El presente tema se aboca tan sólo a hacer un diagnóstico diferencial de las lesiones erosivas y ulcerativas en la mucosa oral.

Para realizar un diagnóstico podemos recurrir a los métodos de exámenes auxiliares cuando son necesarios.

Pero en este tema se hizo un diagnóstico diferencial desde el punto de vista clínico, sólo basándonos en las características clínicas, no se realizó ningún método auxiliar u otro examen.

Las lesiones son diferentes en sus características clínicas y comportamientos clínicos, unas son erosivas, otras ulcerativas.

Las lesiones erosivas son todas aquellas lesiones que tienen pérdida parcial de las capas superiores de epitelio, se caracterizan por ser rojas.

Las lesiones ulcerativas, son llagas que se caracterizan por tener pérdida de epitelio que deja al descubierto una zona zocabada superficial o profundamente, las lesiones ulcerativas casi siempre están acompañadas de vesículas y ampollas que al haber varias vesículas coalescen.

Las lesiones en la mucosa bucal son muchas, pero este tema se abocó a las lesiones erosivas y ulcerativas; describiendo sólo las más frecuentes.