RESUMEN

El fin perseguido en éste trabajo es presentar a los estudiantes y profesionales una alternativa periodontal nueva para tratar **Bolsas Periodontales Proximales** (distal y/omesial), para la **eliminación de procesos inflamatorios** como la **Pericoronaritis**, eliminando las bolsas periodontales así como también evitando su formación.

Esta técnica es sencilla, no necesita de instrumental sofisticado y se puede realizar en el consultorio dental sin ningún inconveniente.

Resumiré en forma breve la técnica propuesta en este trabajo:

Primeramente el paciente deberá pasar por un preoperatorio completo el cual consiste en la limpieza de las piezas dentarias, la enseñanza del cepillado y su correspondiente examen de laboratorio (tiempo de coagulación y sangría).

Luego el paciente pasa a la segunda fase que es la intervención misma.

El paciente deberá estar comodamente sentado, una vez que el instrumental esté convenientemente esterilizado y el profesional se encuentre preparado con mandil, guantes, gorro y barbijo se procede a dar inicio a la intervención que consta de las siguientes partes:

- Primeramente se coloca la anestesia la cual será troncular o infiltrativa, según la zona a operar.
- Una vez anestesiada la zona se realizan las dos incisiones tanto vestibular como lingual o palatina con un bisturí Bard-Parker con hoja intercambiable Nº 15, ambas incisiones deben ser paralelas entre sí, una tercera incisión es

realizada, la cual une las dos anteriores a nivel del diente.

- Luego se realiza el desprendimiento del colgajo con un periostótomo para luego realizar el destartraje y pulido de la zona radicular y la eliminación del tejido conectivo del colgajo.
- Posteriormente se reposiciona el colgajo y se realizan los puntos de sutura los cuales serán protegidos por una porción de cemento periodontal.
- Al cabo de siete días se retira el cemento periodontal y los puntos de sutura.
- A los treinta días se realiza el postoperatorio mediante un examen radiográfico para observar si no hay recurrencia de la bolsa periodontal eliminada en la cirugía.