



ESTE CALCULO SERÁ MEDIANTE m2 DE CONSTRUCCION FACILITADO EN DOLARES

Nº	ITEM	UNIDAD	Precio evaluado dolares americanos
1	PICADO DE REBOQUE EXTERIOR	m2	250 Sus/m2
2	PICADO DE REBOQUE INTERIOR	m2	
3	COLOCADO DE VIGAS	m2	
4	COLOCADO DE LISTONES	m2	
5	COLOCADO DE MALLA EXAGONAL	ML	
6	COLOCADO DE TEJAS COLONIALES	m2	
7	PINTURA EXTERIOR LATEX	m2	
8	PINTURA INTERIOR LATEX	m2	
9	COLOCADO DE MOSAICO	m2	
10	LIMPIEZA GENERAL	m2	



PLANTA GENERAL

Nº	DESCRIPCION	AREA	UNIDAD	PRECIO/M2	SUB-TOTAL	TOTAL
1	Bautisterio	27.00	m2	250	6750	6750.00
2	Altar menor	24.02	m2	250	6005	6005.00
3	Sacristia	28.47	m2	250	7117.5	7117.50
4	Altar menor	24.73	m2	250	6182.5	6182.50
5	Altar menor	32.69	m2	250	8172.5	8172.50
6	Nave	318.73	m2	250	79682.5	79682.50
7	Campanario	14.01	m2	250	3502.5	3502.50

SON CIENTODIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 50/100 DOLARES AMERICANOS

117412.50

SON OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100

821887.50


VEGETACIÓN

Familia:
mimosaceae


Nombre botánico:
Acacia cavenia molina

Nombre común :
Churqui

Forma altura:



Forma diámetro:



Sombra:  **Ambiente:** 

P V O I

FOLIACIÓN

FLORACIÓN

FRUCTIFICACIÓN

ORIGEN:

EXIGENCIAS:

CRECIMIENTO:

USO:

TALLO:

FOLLAJE:

HOJAS:

FLORES:

FRUTOS:

REPRODUCCION:

Mizque, aikuile, valle tupiceño, valle tarijeño, norte y centro argentino, chileno.

Poca exigencia en suelos, resistente a las heladas, gran plasticidad ecológica.

Rápido.

En grupos ocasionalmente aislado.

Tronco pardo oscuro, corteza superficialmente fisurado.

De excepcional figura, laxo, verde claro, perenne.

Compuestas, bipinadas

Anaranjadas, dispuestas en las axilas foliares, pequeñas hermafroditas.

Vaina deprimida y estrangulada, indehisciente.

Semillas.





Familia:
mimosaceae

Nombre botánico:
Acacia macrantha, H.B

Nombre común :
Tacko

Forma altura:



FOLIACCIÓN



FLORACIÓN



FRUCTIFICACIÓN

ORIGEN:

Falda de los cerros q rodean el valle central y alto de Cochabamba

EXIGENCIAS:

Muy rústico, de zonas secas y cálidas, sistema radical superficial, larga vida.

CRECIMIENTO:

Rápidamente rápido.

USO:

Puede ser utilizado aislado o en grupos.

TALLO:

Ramificado desde la base, ramas tortuosas con espinas pareadas, planas.

FOLLAJE:

Semi persistentes, verde oscuro.

HOJAS:

Compuestas, bipinadas

FLORES:

Cabezuela esférica amarillo intenso, de diámetro aproximado de 1cm.

FRUTOS:

Legumbres, vaina lineal incurva, comprimida cilíndrica indehisciente.

REPRODUCCION:

Semillas.

EJEMPLARES:



Colinas.

Familia:
mimosaceae


Nombre botánico:
Acacia visco lor AP

Nombre común :
Morocino

Forma altura:



 **Sombra:**  **Ambiente:**



P **V** **O** **I**

FOLIACION

FLORACION

FRUCTIFICACION

ORIGEN:

Bolivia (Valle Tarijeño), noreste Argentino.

EXIGENCIAS:

Subsuelo húmedo, resistente a los fríos, frágil, evitar la poda.

CRECIMIENTO:

Relativamente lento.

USO:

Aislados o en asociaciones. Muy bueno para sombra.

TALLO:

Fuste corto, comienza a ramificarse a baja altura, corteza rugosa, pardo rojiza.

FOLLAJE:

Tenue, ligero, verde a verde azulado.

HOJAS:

Compuestas caducas, de foliolos pequeños acuminados, con una glándula.

FLORES:

Cabezuela esférica color amarillo cremoso, en grupos axilares fasciculados.

FRUTOS:

Legumbre recta achátada, permanecen largamente como factor ornamental.

REPRODUCCION:


Semillas y retoños radiculares.

Familia:
Apocináceae


Nombre botánico:
Aspidosperma

Nombre común :
Quebracho blanco

Forma altura:



Forma diámetro:



Sombra: **Ambiente:**



P **V** **O** **I**

FOLIACION

FLORACION

FRUCTIFICACION

ORIGEN:

EXIGENCIAS:

CRECIMIENTO:

USO:

TALLO:

FOLLAJE:

HOJAS:

FLORES:

FRUTOS:

REPRODUCCION:

Bolivia (Valle Tarijeño), noroeste Argentino.

Resistente a la sequía y a la poca humedad del aire.

Lento.

En cercos rústicos y en grupos.

Recto, gris amarillento, corteza muy hendida.

Persistente color verde medio.

Coriáceas, dimeras a trímeras, simples elíptico lanceoladas cortamente percioladas.

Pequeñas, color ocre agrupadas en panojas exiliares.

Cápsulas leñosas articulares elípticas y ovales aplanadas, verde grisáceo.


Semillas.

Familia:
Caesal pinaceae


Nombre botánico:
Cassia carnaval spg.

Nombre común :
Carnavalito

Forma altura:



Forma diámetro:



 **Sombra:**  **Ambiente:**



P	V	O	I
---	---	---	---

--	--	--	--

FOLIACION

--	--	--	--

FLORACION

--	--	--	--

FRUCTIFICACION

ORIGEN: Tarija y norte Argentino, selva tucumano-boliviano.

EXIGENCIAS: Rústico, no es exigente en suelos.

CRECIMIENTO: Relativamente lento.

USO: Aislados o en grupos (primeros planos).

TALLO: Ramificado desde la base.

FOLLAJE: Copa baja y extendida de color verde grisáceo, elegante.

HOJAS: Compuestas, grandes, foliolos oblongos lanceolados. Vistasas de color amarillo, agrupadas en grandes inflorescencias.

FLORES: Legumbre linear.

FRUTOS: Por semillas.


REPRODUCCION: Por semillas.

Familia:
Ulmaceae


Nombre botánico:
Celtis spinoza sprengel

Nombre común :
Tala satajchi


Forma altura:



Forma diámetro:




Sombra: Ambiente:



P	V	O	I
---	---	---	---



FOLIACION



FLORACION



FRUCTIFICACION

ORIGEN:	Chaco tarijeño, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay Preferible suelos de planicie aluvial, solo ocasionalmente en colinas.
EXIGENCIAS:	
CRECIMIENTO:	Lento.
USO:	Debe usarse en masas y no aislados.
TALLO:	Tronco sinuoso, superficialmente fisurado, ramas espinosas.
FOLLAJE:	Relativamente denso, caedizo.
HOJAS:	Alternas, simples, ovado lanceolada. Pequeña, sin interés ornamental, color crema, hermafroditas y masculinas.
FLORES:	Dupas pequeñas amarillo - anaranjado, comestibles, maduran en otoño.
FRUTOS:	
REPRODUCCION:	Por semillas, dispersas por aves silvestres.
EJEMPLARES:	Mizque y chaco tarijeño.