


21.-ANEXOS

-- CIPRES CALVO --

--ALTURA Y DIAMETRO --




20 metros pero puede llegar a alcanzar los 40 metros



ORIGEN	sur de estados unidos
EXIGENCIAS	no crecen bien en suelos arcillosos
CRECIMIENTO	lento
USO	en grupos
TALLO	ramificado en forma de candelabro
FOLLAJE	caduco de color verde brillante
HOJAS	alternas, lanceoladas dispuestas en 2 brotes
FLORES	forma de conos colgantes color verde rojizo
REPRODUCCIÓN	por semilla

-- CAMBIOSQUE --
-- PRESENTA--



P	V	O	I					
				FOLIACION				
				FLORACION				
				FRUCTIFICACION				


ORIGEN	Muy común en los valles centrales de Bolivia.
EXIGENCIA	Muy rústico, prefiere suelos húmedos, delicado a las heladas.
CRECIMIENTO	Rápido.
USO	Preferentemente aislado, por su gran belleza, puede también usarse en grupos o alineaciones.
TALLO	Corteza gris oscura rugosa, cubierta de aguijones.
FOLLAJE	Caduco, color verde claro.
HOJAS	Compuestas de 3 folíolos, alternas, caducas, con aguijones recurvados.
FLORES	En grupos, color escarlata o rojo, muy abundantes y decorativas.
FRUTOS	Vainas dehiscentes, comprimidas, angostas, sin interés ornamental.
REPRODUCCION	Por semillas, estacas y acodos.
EJEMPLARES	Plaza Colón, Pairumani, Arocagua, Jardín Botánico.

-- SEIBO CASORIO --


ORIGEN	América tropical.
EXIGENCIA	Prefiere suelos húmedos, delicado a las heladas.
CRECIMIENTO	Rápido.
USO	Aislado, en grupos o alineaciones.
TALLO	Corteza gris oscura rugosa, inerm.
FOLLAJE	Caduco, color verde claro.
HOJAS	Compuestas de 3 folíolos, alternas, semipersistentes. (más grandes que E. Falcata).
FLORES	En grupos, color rosado pastel a anaranjado, muy abundantes y decorativas.
FRUTOS	Vainas dehiscientes, comprimidas, angostas, sin interés ornamental.
REPRODUCCION	Por semillas.



-- FOLLAJE --



-- CAMBIOS QUE --
-- PRESENTA --



-- ALTURA --
-- DIAMETRO --