


ANEXOS

Fichas Paisajísticas.

Mimosaceae
Acacia caven
Aromo criollo

DISTRIBUCIÓN Originaria de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia.
EXIGENCIAS Resistente a las heladas, poco exigente en suelos.
CRECIMIENTO Rápido.
REPRODUCCIÓN Por semillas.
DESCRIPCIÓN Árbol, o arbusto muy ramificado.
HOJAS Bipinnadas, con glándulas en la unión de las pinnas, con 3-10 pares de pinnas de 1-2.5 cm. de largo, cada una con 12-30 pares de foliólulos lineales, de 1-4 mm de largo, glabros.
FLORES Inflorescencias en glomérulos fasciculados, densos, de 1 cm de diámetro, de amarillo-dorados a anaranjado-amarillentos, sobre un pedúnculo de 5-10 mm de longitud.
FRUTOS Lomento duro, grueso, cilíndrico-fusi-forme, verde al principio y luego negro-pardusco lustroso, persistente.
TALLO Corteza negruzca y fisurada longitudinalmente. Ramas gruesas y tortuosas con espinas en pares, blanquecinas, delgadas, de hasta 3 cm de longitud.
FOLLAJE Perenne. Copa esférica o achatada con ramillas flexuosas, nudosas, de color pardo.
USO PAISAJÍSTICO En alineaciones, cercas vivas, en grupos, o aislado.




Laguna Alalay, ciudad Cochabamba, lat=-17.4043506964, lon=-66.1308, elev=2575



USO PAISAJÍSTICO Aislado o en alineaciones, muy ornamental, en jardines y en vías públicas.

FRUCTIFICACIÓN





Salicaceae
Salix pendulina
 Sauce llorón

DISTRIBUCIÓN Originaria del este de Asia.

EXIGENCIAS Muy rústico, prospera en toda clase de climas y suelos prefiere los húmedos. Soporta drenaje pobre.

CRECIMIENTO Mediano.

REPRODUCCIÓN Por esquejes e injertos.

DESCRIPCIÓN Árbol grande.

HOJAS Linear-lanceoladas, de 8-16 cm de longitud, acuminadas, de borde finamente aserrado, lampiñas y algo glaucas en el envés cuando adultas. Pecíolo corto y algo pubescente.

FLORES Unisexuales en amentos péndulos. Flores masculinas con 2 estambres libres. Flores femeninas con 2 estigmas.

FRUTOS Cápsula dehiscente bivalvada con muchas semillas microscópicas.

TALLO Tronco con la corteza fisurada, pardo oscura que se fisura con los años.

FOLLAJE Caducifolio, pendulo y sumamente elegante, verde claro.


USO PAISAJÍSTICO Aislado para que pueda resaltar su bello porte. Se lo suele plantar cerca de cursos de agua o de estanques aislados.

FORMA



ALTURA


DIÁMETRO




FOLIACIÓN



FLORACIÓN



FRUCTIFICACIÓN



Bignoniaceae
Tabebuia aurea
 Tajiño amarillo

DISTRIBUCIÓN Sudamérica tropical y subtropical, Brasil, Bolivia, Argentina y Uruguay.

EXIGENCIAS Clima húmedo y cálido. Suelo arenoso o arcilloso, sensible a las heladas y la sequía.

CRECIMIENTO Lento.

REPRODUCCIÓN Por semillas.

DESCRIPCIÓN Árbol mediano.

HOJAS Palmadas, opuestas, alargadas de consistencia dura. Con 5-7 foliolos (de 8 a 10 cm de largo) pedicelados, glabros, elípticos de ápice agudo o acuminado, de borde dentado. Pecíolo de 6 a 8 cm. densa pubescencia principalmente en el envés.



FLORES Grandes, amarillas, agrupadas en la punta de las ramas, corola gamopétala con tubo vellosos en su parte inferior.

FRUTOS Cápsula linear cilíndrica delgada en los extremos 10-15 cm de largo, interior lanoso pubescente, semillas aladas.

TALLO Fuste de corteza con surcos separados; ramas retorcidas.

FOLLAJE Caduco. Copa abierta y rala.

USO PAISAJÍSTICO Aislado o en pequeños grupos. Muy ornamental por su espectacular floración previa a la foliación.



San Javier, Santa Cruz de la Sierra.



Fabaceae
Senna spectabilis
Carnavalito

DISTRIBUCIÓN Nativa desde México hasta Argentina.

EXIGENCIAS Suelos más o menos fértiles y carentes de cal. Clima cálido a templado.

CRECIMIENTO Rápido.

REPRODUCCIÓN Por semillas y por esquejes de madera dura.

DESCRIPCIÓN Árbol mediano.

HOJAS Pinnadas 10-15 pares de folíolos de ovados a lanceolados y 5-6 cm de longitud, agudos o subagudos, con el envés pubescente.

FLORES Amarillas 3.5 cm de diámetro en racimos axilares más cortos que las hojas; tienen 5 pétalos desiguales y 7 estambres fértiles.


FRUTOS Legumbre linear-cilíndrica 10-20 cm de longitud, leñosa, de color negro y con numerosas semillas.

TALLO Ramificado muy cerca de la base.

FOLLAJE Pubescente, verde brillante, copa baja y extendida.


USO PAISAJÍSTICO Aislado o en grupos preferentemente en primeros planos. Interesante para alineaciones. De gran valor ornamental por su espectacular floración.

FORMA



ALTURA


DIÁMETRO




FOLIACIÓN



FLORACIÓN




FRUCTIFICACIÓN



MIROSACEAE

ACACIA CAVERIA MOLINA

CHURQUIL, ESPINILLO,
ESPIÑO



■ SOMBRA ○ AMBIENTE

P V O I

FOUACION

FLORACION

FRUTOS

FRUCTIFICACION

ORIGEN

EXIGENCIAS

CRECIMIENTO

USO

TALLO

FOLLAJE

HOJAS

FLORES

FRUTOS

REPRODUCCION

EJEMPLARES

Mizque, Alquílo, valle Tupizaño, Tarijaño, Nono y Cerro Argemino, Chila.

Poco exigente en suelos, resistente a los helados, gran plasticidad ecológica.

Rápido.

En grupos, ocasionalmente aislado.

Tronco corto oscuro, corteza superficialmente fisurada.

De excepcional finura, liso, verde claro, perenne.

Compuestas, bipinnadas, insertas en ramilletes de dos a cinco hojas; folíolos

lineales de pequeña longitud, espínas claras en las ramas menores.

Anisópteras, dispuestas en las axilas foliares, pequeñas, hermafroditas.

Vaina deprimida y estrangulada, indehiscente.


Semillas.

De reciente introducción, ejemplares jóvenes en el Jardín Botánico y 4 espinas.

BIGNONIACEAE

TABERNAEVEAE
LCR. EX GRISEB.
(Syn. TECOMA,
AVELLANACEAE)

TAJIBO ROSADO,
LAPACHO ROSADO



SONERA AMBIENTE

P V O I


FOLIAJE

FLORACION

FRUTOS

FRUCTIFICACION



ORIGEN Formación subtrópica Tucumán-Boliviana.
EXIGENCIAS Moderadamente resistente a las heladas, suelo húmedo.
CRECIMIENTO Lento.
USO Alzado, en grupos y alineaciones.
TALLO Rugoso, cilíndrico, ramificaciones dicotómicas.
FOLIAJE Caduco, verde medio.
HOJAS Compuestas, palmiformes, 5 foliolos largamente peciolados, aguda elíptica; más grandes las superiores que las de la base, de borde serrado.
FLORES Grandes tubulares, máximas de color rosado. (Tipo rosado volapoco, o blanco).
FRUTOS Vainas largas y angostas, dehiscentes.
REPRODUCCION Por semillas.
OBSERVACIONES Reciente introducción en la ciudad de Cochabamba ha presentado buena adaptación.
EJEMPLARES Avenida Benavente, Jardín Botánico, puente de Quilispalla.



BIGNONIACEAE

TABEBUIA OCHRACEA
Syn. TEBOMA OCHRACEA

TAJIBO AMARELO,
LAPACHO AMARELO



ORIGEN	América tropical.
EXIGENCIAS	Mediamente resistente a los fríos, sub suelo húmedo.
CRECIMIENTO	Lento.
USO	Aislado, en grupos y alineaciones.
TALLO	Rugoso, cilíndrico, ramificaciones dicotómicas.
FOLIAJE	Caduco, verde medio.
HOJAS	Compuestas, palmiformes: 5 folíolos largamente pedicelados, agudo elípticos más grandes los superiores que los de la base, y pubescentes.
FLORES	Grandes tubulosas, racimos de color amarillo.
FRUTOS	Vainas largas y angostas, dehiscentes.
REPRODUCCION	Por semillas.

