


# ANEXOS











BIGNONIACEAE

JACARANDA MIMOSIFOLIA  
D. DON  
SYN: J. ACUTIFOLIA  
H. et B.

PAJPACU, TARCO,  
JACARANDA

P V O I

FOLIACION


FLORACION

FRUCTIFICACION

**ORIGEN** Valles de los ríos Caine y Pilcomayo, formación Tucumano-Boliviana.  
**EXIGENCIA** Relativamente rústico, sensible a las heladas.  
**CRECIMIENTO** Relativamente rápido.  
**USO** De gran belleza, útil en grupos y aislado. Por sistema radical profundo no levanta aceras.  
**TALLO** Tronco derecho, corteza pardo grisácea hendida.  
**FOLLAJE** Verde grisáceo muy elegante semejando un conjunto de plumas, caduco o persistente de acuerdo a la humedad del terreno en invierno.  
**HOJAS** Compuestas alterno-pinnadas, folíolos muy aguzados.  
**FLORES** Abundantes, inflorescencias paniculares de hasta 30 cm. de longitud, de color celeste violáceo brillante, generalmente aparecen antes que las hojas.  
**FRUTOS** Cápsulas leñosas planas dehiscentes que permanecen largamente.  
**REPRODUCCION** Por semilla.  
**EJEMPLARES** La Paz esq. Baptista, Jardín Botánico, plazas y parques.

47








FABACEAE

ERYTHRINA FALCATA  
BENTH.

CHILLIJCHI, SEIBO,  
CUNURI



P V O I

FOLIACION

FLORACION

FRUCTIFICACION



ORIGEN Muy común en los valles centrales de Bolivia.  
 EXIGENCIA Muy rústico, prefiere suelos húmedos, delicado a las heladas.  
 CRECIMIENTO Rápido.  
 USO Preferentemente aislado, por su gran belleza, puede también usarse en grupos o alineaciones.  
 TALLO Corteza gris oscura rugosa, cubierta de agujones.  
 FOLLAJE Caduco, color verde claro.  
 HOJAS Compuestas de 3 folíolos, alternas, caducas, con agujones recurvados.  
 FLORES En grupos, color escarlata o rojo, muy abundantes y decorativas.  
 FRUTOS Vainas dehiscentes, comprimidas, angostas, sin interés ornamental.  
 REPRODUCCION Por semillas, estacas y acodos.  
 EJEMPLARES Plaza Colón, Pairumani, Arocaagua, Jardín Botánico.




MIMOSACEAE

ENTEROLOBIUM CONTORTISILIQUM (VELL)  
MORONG.  
SYN: E. TIMBOUVA MART.

TIMBO, PACARA, OREJA DE NEGRO, TOCO




■	○	
SOMBRA	AMBIENTE	
P	V	O
I		
FOLIACION		
HOJAS		
FLORACION		
FRUCTIFICACION		

ORIGEN: Sudeste de Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil.

EXIGENCIA: Poco exigente en suelos, prefiere los livianos, sensible al frío.

CRECIMIENTO: Rápido.

USO: Excelente para sombra, aislado, en grupos y/o alineaciones, sólo es recomendable para calles o avenidas de aceras muy anchas.

TALLO: Derecho, corteza gris plateada, levemente hendida, con abundantes lentiselas.

FOLLAJE: Verde claro contrastando con el glauco del tronco y ramas, copa extendida en forma de amplia sombrilla.

HOJAS: Caducas, compuestas, glabras, alternas, bipinnadas, foliolos agudos lanceolados, nervadura a un costado.


FLORES: Inflorescencia globosa, blanco amarillentas relativamente vistosas.

FRUTOS: Legumbre de forma similar a oreja humana subleñosa y negra, permanece largamente.

REPRODUCCION: Fácilmente por semillas.

EJEMPLARES: Jardín Botánico.






BOMBACACEAE

CHORISIA INSIGNIS H.B.K.  
CHORISIA SPECIOSA  
ST. HIL.

TOBOROCHI,  
PALO BORRACHO  
(FLOR BLANCA CREMOSA)  
(FLOR ROSADA)

**ORIGEN** Sud-Este boliviano y norte argentino (formación chaqueña)

**EXIGENCIA** Sensible al frío, vegeta bien al abrigo de otras especies, suelos húmedos y ricos.

**CRECIMIENTO** Lento en clima templado, rápido en el trópico.

**USO** Aislado por su hermoso porte y floración, también en avenidas amplias.

**TALLO** Tronco muy abultado (más la *Chorisia Insignis*, que la especie de flor rosada) corteza verde grisácea a erizada, de agujijones, (más abundantes también en la *Chorisia Insignis*).

**FOLLAJE** Irregular, caduco, color verde claro.

**HOJAS** Compuestas, digitadas, con 4 a 7 folíolos oblongos acuminados en la base y ápice aserrado.

**FLORES** Grandes, solitarias, cáliz soldado y 5 pétalos libres, blanco amarillentos o rosado-lila.

**FRUTOS** Cápsulas ovoidales grandes que al abrirse dejan escapar las semillas envueltas en una fibra sedosa muy abundante.

**REPRODUCCION** Por semilla.

**EJEMPLARES** Ex-estación Railway, Plaza 14 de Septiembre, Jardín Botánico.


■ SOMBRA
○ AMBIENTE

P	V	O	I
FOLIACION			
FLORACION			
FRUCTIFICACION			



37






BIGNONIACEAE

TABEBUIA OCHRACEA  
Syn. TECOMA OCHRACEA

TAJIBO AMARILLO,  
LAPACHO AMARILLO



■ SOMBRA
○ AMBIENTE

P	V	O	I
FOLIACION			
FRUCTIFICACION			

**ORIGEN** América tropical.

**EXIGENCIAS** Medianamente resistente a los fríos, subsuelo húmedo.

**CRECIMIENTO** Lento.

**USO** Aislado, en grupos y alineaciones.

**TALLO** Rugoso, cilíndrico, ramificaciones dicótomas.

**FOLLAJE** Caduco, verde medio.

**HOJAS** Compuestas, palmiformes, 5 folíolos largamente peciolados, agudo elípticos más grandes los superiores que los de la base, y pubescentes.

**FLORES** Grandes tubulosas, racimos de color amarillo.

**FRUTOS** Vainas largas y angostas, dehiscentes.

**REPRODUCCION** Por semillas.

