

RESUMEN

Los hábitos bucales durante la infancia pueden influir negativamente en el crecimiento y desarrollo dentomaxilofacial. El presente estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre hábitos bucales, efectos clínicos y aparatología interceptiva utilizada en pacientes pediátricos atendidos en la Clínica de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho".

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal, basado en la revisión de historias clínicas, fotografías intraorales, extraorales, radiografías y modelos de estudio correspondientes a 35 pacientes de entre 5 a 10 años de edad. Las variables analizadas incluyeron sexo, edad, hábitos bucales, efectos clínicos y tipo de aparatología utilizada.

Los resultados evidenciaron predominio del sexo femenino y mayor frecuencia en pacientes de 8 años. Los hábitos bucales más observados fueron la succión no nutritiva, deglución atípica y respiración bucal. Entre los principales efectos clínicos identificados se encontraron la mordida abierta anterior, mordida cruzada anterior y alteraciones transversales del maxilar superior. La aparatología más utilizada fue la placa removible con tornillo expansor.

Se concluye que los hábitos bucales persistentes durante la infancia se relacionan con alteraciones dentomaxilofaciales que pueden requerir tratamiento interceptivo temprano, siendo la aparatología interceptiva una alternativa para favorecer el adecuado desarrollo del sistema estomatognático.

Palabras clave: hábitos bucales, aparatología interceptiva, maloclusión, ortodoncia interceptiva, pacientes pediátricos